

Lisdexamfetamine

(读音为“lis-decks-am-feta-meen”)



注意

您被开具了处方药
lisdexamfetamine后需阅读此
说明简介。

您已被开具处方药 lisdexamfetamine 来治疗注意缺陷多动障碍 (ADHD)。这种药可以帮助您集中注意力, 控制冲动并让您感觉更加平静。

药物只是治疗 ADHD 的一部分, 只有与健康习惯和行为改变相结合才能达到最佳效果。

开始服用 lisdexamfetamine



您的医疗保健人员会让您从低剂量开始。他们可能会增加剂量, 这取决于药物的效果和副作用。



您需要定期检查, 通常每 6 个月一次, 以了解药物的效果以及是否需要
进行任何更改。

如何服用 lisdexamfetamine



坐着或站着用一杯水送服胶囊。不要咀嚼或碾碎药物。

如果您吞咽困难:

- 打开胶囊并将内容物倒入一杯水或果汁中。搅拌直至溶解并立即饮用。
- 或者, 打开胶囊并将内容物添加到一些酸奶中。马上全部吃完。

何时服用 lisdexamfetamine



由于它是一种长效药物, 因此您只需每天服用一次。

→ 避免在下午或晚上服用, 因为它可能会导致睡眠问题。

→ 如果您有一天忘记服用, 请跳过。切勿同时服用两剂。



告诉您的医疗保健提供者您正在服用 lisdexamfetamine



在服用任何新的药物或草药补充剂前都须确认其安全性。某些药物可能会影响 lisdexamfetamine。



如果您怀孕、准备怀孕或开始母乳喂养，请告知您的医疗保健提供者。



停用 lisdexamfetamine 前请告诉您的医疗保健提供者。突然停止服药可能会产生副作用。



重要：

此药是专门为您开具的。不要与他人分享。
请将 lisdexamfetamine 存放在儿童
和宠物接触不到的安全地方。

本说明书是一个简短的摘要。
更多信息请访问 www.healthify.nz/lisdexamfetamine

所有药物都有副作用

Lisdexamfetamine 可能会引起副作用，尽管不是每个人都会经历。

常见副作用

这些症状通常比较轻微，并且会随着时间而消失。如果这些副作用给您带来问题或持续不退，请咨询您的医疗保健提供者：

- 入睡困难
- 腹痛、便秘、腹泻（稀便）
- 头痛
- 焦虑
- 食欲不振（您可能不想吃东西）。

严重副作用

如果您发现任何以下副作用，请立即联系您的医疗保健提供者或**健康热线**，电话**0800 611 116**：

- 易怒、有攻击性、情绪变化、感觉要伤害自己或他人
- 突然不受控制的言语或动作
- 胸痛、昏厥、手脚麻木或刺痛。