


# Paxlovid

(读音为‘帕克斯洛维得’)



Paxlovid 适用于治疗某些 COVID-19 病毒感染者，有助于患者迅速康复和避免住院。

Paxlovid 由两种抗病毒药物组成。两种药物合用时，可以降低患者体内的病毒量。Paxlovid 只在感染 COVID-19 后的5天内给药时有效，所以将由医生决定您是否需要此药物。

## Paxlovid剂量：每次服用3片，每天两次，持续服用五天



每天早晨

服用2片粉色片剂，外加  
1片白色片剂



每天晚间

服用2片粉色片剂，外加  
1片白色片剂

患者需要一个疗程，即5天。

可以在或不在用餐时服用。

在未告知您的医务人员之前，  
请勿停止服用 Paxlovid，即使  
您自我感觉改善。


## 将您服用的所有药物告诉您的医务人员


某些药物可能不应与 Paxlovid 混用，合用时可能会引起严重副作用。

如果您正在或最近曾经服用其它药物，包括处方药和非处方药、维生素和草药补剂(例如圣约翰草)，请告知您的医生或药剂师。

在未告知您的医务人员之前，请勿开始服用新药物。您的医务人员会告诉您 Paxlovid 与其它药物合用是否安全。

## 如果您漏服一剂

 如果您在正常服药时间的8小时内漏服一剂，请在想起时尽快服用。

 如果您的漏服时间超过8小时，请跳过漏服剂量，在下次正常服药时间服用下一剂量。

 请勿服用额外 Paxlovid 剂量以期弥补漏服剂量。

 常见、罕见和严重副作用见下页

## 如果您已经怀孕或计划怀孕？



如果您已经怀孕、感觉您可能怀孕或正在计划怀孕，请勿服用 Paxlovid。

请征求您的医生建议，因为不建议孕妇服用 Paxlovid。

在 Paxlovid 治疗期间和治疗结束后7天内，女性应该避免怀孕（即采用避孕措施或禁欲）。

### 避孕非常重要

如果您正在服用避孕药物，应格外小心，因为 Paxlovid 可能会影响避孕药物的效果。

在 Paxlovid 治疗期间和治疗结束后7天内，除了您通常采用的避孕措施外，还建议您禁欲或使用避孕套。

请征求您的医生或药剂师的建议。

## 如果您正在哺乳

在 Paxlovid 治疗期间和治疗结束后7天内，不建议哺乳。

在服用此药物之前，请告知您的医务人员，您正在哺乳。

## 所有药物都有一些副作用

Paxlovid 会引起副作用，尽管不是每个人都会出现副作用。

### 常见副作用

这些副作用通常比较轻微，会随时间或在停药后消失。如果这些副作用对您造成影响或不自动消失，请告知您的医生：

- 拉稀（腹泻）
- 不适（呕吐）
- 味觉改变

### 罕见、严重副作用

如果您出现这些副作用，请立即联系您的医务人员或致电 **Healthline (0800 611 116)**，告知您正在服用 Paxlovid：

- 过敏反应体征，例如：
  - 皮疹
  - 眼睑或眼周围、面部、嘴唇或舌头浮肿或肿胀
  - 胸闷和呼吸困难
- 肝脏问题体征，例如：
  - 眼球或皮肤变黄
  - 尿色变深
  - 上腹部疼痛或不适

 欲详细了解 Paxlovid，请访问网站：[hn.org.nz/paxlovid](https://hn.org.nz/paxlovid)