

Molnupiravir

(发音为莫诺皮拉韦尔)



Molnupiravir 适用于感染 COVID-19 病毒的某些患者，可以帮助患者迅速康复和免于接受住院治疗。

如果在出现 COVID-19 疾病症状后的 5 天内服用，Molnupiravir 可以降低患者体内的病毒量。您的医生将决定您是否需要服用此药物。

Molnupiravir 剂量: 每天两次, 每次服用4粒胶囊, 持续服用五天



每天早晨

服用 4 粒胶囊



每天晚间

服用 4 粒胶囊

间隔 12 小时服用一次剂量, 即 4 粒胶囊
(例如, 在早晨 8 点服用 4 粒胶囊,
在晚间 8 点服用 4 粒胶囊)


用一杯水送服整个胶囊。
不得打开、咀嚼、折断或
压碎胶囊。


您可以在或不在用餐时
服用胶囊。


需要完成整个治疗疗程,
即 **5 天**。

在未告知医务人员之前,
请勿停止服用
Molnupiravir,
即使您自我感觉改善。

如果您漏服一剂

 如果您在正常服药时间的 **10 小时内**
漏服一剂, 请在想起时尽快服用。

 如果您的漏服时间**超过 10 小时**,
请跳过漏服剂量, 在下一次正常
服药时间服用下一剂量。

 请勿服用额外 Molnupiravir 剂量
以期弥补漏服剂量。

将您服用的所有药物告诉 您的医务人员

在服用新药物、维生素或草药补品之前,
请咨询您的医生或药剂师是否安全。
某些药物会影响 Molnupiravir。

 常见、罕见和严重副作用见下页

妊娠与 molnupiravir

采取避孕措施对于男性和女性都非常重要



对妊娠的影响:

服用 Molnupiravir 会对胎儿造成威胁。

在服用 Molnupiravir 期间**和**治疗结束后 4 天内, 应该避免怀孕 (即采用避孕措施或禁欲)。

如果在服用 Molnupiravir 期间或服用后不久发现自己怀孕, 请联系您的医疗保健提供者寻求建议。



对精子的影响:

尚不知 Molnupiravir 是否会影响人体内的精子。

如果您与可能怀孕的配偶发生性行为, 在 Molnupiravir 您应该在治疗期间**和**服用末次剂量后 3 个月内需采取可靠的避孕措施。

您正在哺乳吗?

在 Molnupiravir 治疗期间**和**服用末次剂量 4 天内, 不建议哺乳。

在服用此药物**之前**, 请告知您的医疗保健提供者, 您正在哺乳。

所有药物都有一些副作用

Molnupiravir 会引起一些副作用, 但并非每个人都会出现。

常见的副作用

这些副作用通常比较轻微, 会随着时间的推移或在停药后消失。如果这些副作用对您造成影响或不自动消失, 请告知您的医生:

- 稀便 (腹泻)
- 不适 (恶心)
- 头晕。

罕见、严重副作用

如果您出现过敏反应体征, 请立即联系您的医疗团队或致电 **Healthline (0800 611 116)**:

- 皮疹
- 眼睑或眼周围、面部、嘴唇或舌头浮肿或肿胀
- 胸闷
- 呼吸困难。



有关 Molnupiravir 的更多信息, 请访问网站 hn.org.nz/molnupiravir